

## Το φάσμα ενός πολλαπλασιαστικού τελεστή

Έστω  $(X, \mu)$  χώρος  $\sigma$ -πεπερασμένου μέτρου. Υπενθύμιση: Αν  $f \in L^\infty(X, \mu)$  ορίζεται ο τελεστής

$$M_f : g \rightarrow fg : L^2(X, \mu) \rightarrow L^2(X, \mu).$$

Είναι (καλά ορισμένος) φραγμένος τελεστής και  $\|M_f\| = \|f\|_\infty$ .

Ελέγχεται άμεσα ότι η απεικόνιση

$$f \rightarrow M_f : L^\infty(X, \mu) \rightarrow \mathcal{B}(L^2(X, \mu))$$

είναι μορφισμός αλγεβρών, δηλαδή

$$M_{f+g} = M_f + M_g, \quad M_{fg} = M_f M_g,$$

που διατηρεί την ενέλιξη ( $M_f^* = M_{\bar{f}}$ ) και τη μονάδα ( $M_1 = I$ ). Συνεπώς, αν η  $f$  είναι αντιστρέψιμο στοιχείο της άλγεβρας  $L^\infty(X, \mu)$ , τότε ο  $M_f$  είναι αντιστρέψιμο στοιχείο<sup>1</sup> της άλγεβρας  $\mathcal{B}(L^2(X, \mu))$ .

Αν αντίστροφα ο τελεστής  $M_f$  είναι αντιστρέψιμος, είναι αλήθεια ότι ο αντίστροφός του, έστω  $T$ , είναι και αυτός πολλαπλασιαστικός τελεστής; Η απάντηση είναι θετική. Πράγματι, παρατήρησε κατ' αρχήν ότι

- η  $f$  είναι  $\mu$ -σχεδόν παντού διάφορη του μηδενός.

Γιατί αν υπήρχε  $Y \subseteq X$  θετικού μέτρου ώστε  $f|_Y = 0$ , τότε, θεωρώντας την χαρακτηριστική συνάρτηση  $\chi$  ενός υποσυνόλου του  $Y$  με πεπερασμένο μη μηδενικό μέτρο,<sup>2</sup> θα είχαμε  $\chi \in L^2(X, \mu)$ ,  $\chi \neq 0$  και  $M_f \chi = f\chi = 0$ , πράγμα που αποκλείεται, αφού ο  $M_f$  είναι 1-1.

Επομένως η συνάρτηση  $g = 1/f$  ορίζεται  $\mu$ -σχεδόν παντού και είναι βεβαίως μετρήσιμη. Ισχυρίζομαι ότι

- η συνάρτηση  $g = 1/f$  είναι ουσιωδώς φραγμένη.

Πράγματι, η σχέση  $M_f T h = h$  για κάθε  $h \in L^2(X, \mu)$ , δηλαδή  $f(x)(Th)(x) = h(x)$   $\mu$ -σχεδόν για κάθε  $x \in X$ , δίνει  $Th = \frac{1}{f}h = gh$ , επομένως  $\|gh\|_2 = \|T(h)\|_2 \leq \|T\| \|h\|_2$  για κάθε  $h \in L^2(X, \mu)$ , πράγμα που σημαίνει (Άσκηση!) ότι η  $g$  είναι ουσιωδώς φραγμένη. Συμπέρασμα:

**Πρόταση 1.** Αν  $f \in L^\infty(X, \mu)$ , ο τελεστής  $M_f$  είναι αντιστρέψιμος αν και μόνον αν η  $f$  είναι αντιστρέψιμο στοιχείο της άλγεβρας  $L^\infty(X, \mu)$ , αν δηλαδή η  $1/f$  (ορίζεται  $\mu$ -σχεδόν παντού και) είναι ουσιωδώς φραγμένη. Ο αντίστροφός του (αν υπάρχει) είναι ο  $M_g$  όπου  $g = 1/f$ .

Αντικαθιστώντας την  $f$  με τη συνάρτηση  $f - \lambda$ , συμπεραίνουμε ότι ένας μιγαδικός αριθμός  $\lambda$  ικανοποιεί  $\lambda \notin \sigma(M_f)$  αν και μόνον αν η  $\frac{1}{f-\lambda}$  ορίζεται ( $\mu$ -σχεδόν παντού) και είναι ουσιωδώς φραγμένη, δηλαδή υπάρχει σταθερά  $C < \infty$  ώστε  $\frac{1}{|f-\lambda|} \leq C$   $\mu$ -σχεδόν παντού, δηλαδή το σύνολο  $\{x \in X : |f(x) - \lambda| < \frac{1}{C}\}$  έχει μέτρο μηδέν. Γράφοντας  $\delta$  αντί για  $\frac{1}{C}$ , έχουμε ισοδύναμα

$$\lambda \notin \sigma(M_f) \iff \exists \delta > 0 : \mu(\{x \in X : |f(x) - \lambda| < \delta\}) = 0.$$

Επομένως δείξαμε ότι

**Πρόταση 2.** Αν  $f \in L^\infty(X, \mu)$ , το φάσμα του τελεστή  $M_f$  είναι το σύνολο των  $\lambda \in \mathbb{C}$  ώστε για κάθε  $\delta > 0$  το σύνολο  $\{x \in X : |f(x) - \lambda| < \delta\}$  να έχει θετικό μέτρο. Το σύνολο αυτό το ονομάζεται ουσιωδές σύνολο τιμών (essential range) της  $f$ .

<sup>1</sup> Αν  $fg = \mathbf{1}$  τότε  $M_f M_g = M_g M_f = M_{fg} = M_1 = I$ .

<sup>2</sup> Εδώ χρειάζεται να υποθέσουμε ότι κάθε μετρήσιμο σύνολο θετικού μέτρου περιέχει ένα υποσύνολο με πεπερασμένο θετικό μέτρο. Αυτό ισχύει πάντα π.χ. όταν το  $\mu$  είναι  $\sigma$ -πεπερασμένο.