

## Στοχαστικός Λογισμός 2021

### Ασκήσεις II

1. Με τις υποθέσεις της Πρότασης 8.9, δείξτε ότι

$$\sum_{j=1}^{k(n)} f(B_{\xi_j^{(n)}})(B_{t_j^{(n)}} - B_{t_{j-1}^{(n)}})^2 \rightarrow \int_0^t f(B_s) ds$$

κατά πιθανότητα καθώς  $n \rightarrow \infty$ , όπου  $\xi_j^{(n)} \in [t_{j-1}^{(n)}, t_j^{(n)}]$  για κάθε  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq j \leq k(n)$ . Δηλαδή, σε αυτή την πρόταση δεν είναι κρίσιμο το  $\xi$  να είναι το αριστερό άκρο του διαστήματος (ενώ αυτό έχει σημασία στην Πρόταση 11.5 όπως φαίνεται από την Άσκηση 9.6)

2. (Γέφυρα Brown. Τέσσερις περιγραφές) Έστω  $B = (B_s)_{s \in [0, \infty)}$  μονοδιάστατη τυπική κίνηση Brown.

(α) Να δειχθεί ότι η ανέλιξη  $X_t = B_t - tB_1$ ,  $t \in [0, 1]$  είναι Γκαουσιανή και να υπολογιστούν η συνάρτηση μέσης τιμής και η συνάρτηση συνδιακύμανσής της (ορισμοί πιο κάτω).

(β) Κάντε το ίδιο για την ανέλιξη

$$Y_t := (1-t) \int_0^t \frac{1}{1-s} dB_s, t \in [0, 1].$$

(γ) Κάντε το ίδιο για την ανέλιξη

$$Z_t := (1-t)B_{t/(1-t)}, t \in [0, 1].$$

(δ) Στο (α), δείξτε ότι η  $B_1$  είναι ανεξάρτητη από την ανέλιξη  $X$ . Για κάθε  $\varepsilon > 0$ , θεωρούμε την ανέλιξη  $(U^{(\varepsilon)}(t))_{t \in [0, 1]}$  με<sup>1</sup>

$$U^{(\varepsilon)} = (B|\{|B_1| < \varepsilon\})$$

(στο δεξί μέλος, θεωρούμε τον περιορισμό της  $B$  στο  $[0, 1]$ ). Να δειχθεί ότι  $U^{(\varepsilon)} \Rightarrow X$  καθώς  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  [σύγκλιση κατά κατανομή για τυχαίες μεταβλητές με τιμές στον  $C([0, 1])$ ].

(ε) Δείξτε ότι οι  $X|_{[0, 1]}$ ,  $Y, Z$  έχουν την ίδια κατανομή και έπειτα δείξτε λεπτομερώς πώς αυτό συνεπάγεται το ότι  $\mathbf{P}(\lim_{t \rightarrow 1^-} Y_t = 0) = 1$ . Δείξτε και με άλλο τρόπο ότι  $\mathbf{P}(\lim_{t \rightarrow 1^-} Z_t = 0) = 1$ .

**Ορισμός:** Μια ανέλιξη  $(X_t)_{t \in I}$  [όπου  $I$  είναι σύνολο και για κάθε  $t \in I$  η  $X_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ] λέγεται Γκαουσιανή αν για κάθε  $n \in \mathbb{N}^+$  και  $i_1, i_2, \dots, i_n \in I$  διαφορετικούς δείκτες, το διάνυσμα  $(X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_n})$  είναι Γκαουσιανό.

Η συνάρτηση μέσης τιμής της  $X$  είναι η  $m : I \rightarrow \mathbb{R}$  με  $m(i) = \mathbf{E}(X_i)$  για κάθε  $i \in I$ , και η συνάρτηση συνδιακύμανσης της  $X$  είναι η  $C : I \times I \rightarrow \mathbb{R}$  με  $C(i, j) = \text{Cov}(X_i, X_j)$  για κάθε  $i, j \in I$ .

**Σχόλια.** Ο χαρακτηρισμός του νόμου της  $X$  που δίνεται από το (δ) δικαιώνει το όνομα «γέφυρα Brown». Λέει ότι  $X = B|\{|B_1| = 0\}$ , δηλαδή η  $X$  είναι το μονοπάτι της κίνησης Brown στο  $[0, 1]$  με τη δέσμευση τον χρόνο 1 να ξαναγυρίσει στο 0. Επειδή το γεγονός  $B_1 = 0$  έχει πιθανότητα 0, δεσμεύσαμε ως προς το  $\{|B_1| < \varepsilon\}$  και πήραμε  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

Η έκφραση  $Y$  στο (β) είναι λύση μιας στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης που έχουμε συναντήσει (άσκηση 14.1 στις σημειώσεις του μαθήματος).

<sup>1</sup>Εδώ η δέσμευση είναι αυτή των στοιχειωδών πιθανοτήτων. Δηλαδή, η κατανομή της  $U^{(\varepsilon)}$  ορίζεται ως εξής. Για κάθε  $A \subset \mathcal{B}(C([0, 1]))$  έχουμε  $\mathbf{P}(U^{(\varepsilon)} \in A) := \mathbf{P}(B \in A, |B_1| < \varepsilon) / \mathbf{P}(|B_1| < \varepsilon)$ .  $B$  ο περιορισμός της κίνησης Brown στο  $[0, 1]$ .