


Επιθήλιο



Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, MD PhD
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβρυολογίας

Γνώση

Πληροφορίες

ή


???????

Ποιό είναι το ζητούμενο στα μαθήματα ;


- Να βγάξετε νόημα από την πληροφορία
- Να διακρίνετε τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο
- Να μπορείτε να συνδυάσετε πολλές επιμέρους πληροφορίες για να φτιάξετε μια ευρύτερη εικόνα

Όστε

- Πολλές επιμέρους εικόνες, μέσα από κριτική σκέψη, θα σας οδηγήσουν στην συνδυαστική σκέψη του γιατρού, την ικανότητα ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ



Επιθήλιο





Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, MD PhD
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβρυολογίας

Επιθήλιο

σύνολο στενά συνδεδεμένων επιθηλιακών κυττάρων, που καλύπτουν ή επενδύουν επιφάνειες του σώματος



από επιθήλιο σχηματίζονται οι λειτουργικές μονάδες των εκκριτικών αδένων



Λειτουργίες επιθηλίων



- Προστασία : δέρμα,
- Απορρόφηση : λεπτό και παχύ έντερο,
- Μεταφορά υλικών στην κυτταρική επιφάνεια : κροσσοί,
- Έκκριση : αδένες,
- Απέκκριση : νεφρικά σωληνάκια,
- Ανταλλαγή αερίων : πνευμονικές κυψελίδες,
- Διολίσθηση μεταξύ κυτταρικών επιφανειών : μεσοθήλιο

Χαρακτηριστικά επιθηλίων


- Ανανεώνονται με *μίτωση*,
- Τρέφονται με *διάχυση* (δεν έχουν αιματική/λεμφική παροχή),
- Δεν έχουν παρά *ελάχιστο ελεύθερο μεσοκυττάριο χώρο*,
- Έχουν δομική και λειτουργική **πολικότητα**,
- Η **συνοχή** τους διατηρείται από *μόρια κυτταρικής προσκόλλησης και συνδετικά σύμπλοκα*,
- Στηρίζονται στο *βασικό υμένιο*, ο οποίος μαζί με συστατικά του υποκείμενου *συνδετικού ιστού* σχηματίζει τη *βασική μεμβράνη*.

Ταξινόμηση διαφορετικών τύπων επιθηλίων

1. Σχήμα μεμονωμένων κυττάρων




2. Διάταξη σε στιβάδες, μία ή περισσότερες



Μονόστιβα επιθήλια




α. Μονόστιβο πλακώδες

Νεφρός, κάψα του Bowman



Μονόστιβα επιθήλια

α. Μονόστιβο πλακώδες Ενδοθήλιο




**Επίπεδα επιθηλιακά κύτταρα
Πυρήνας πεπλατισμένος,
κυτταρόπλασμα συνήθως όχι ευδιάκριτο**

Μονόστιβα επιθήλια

α. Μονόστιβο πλακώδες





Μεσοθήλιο (περιτόναιο, υπεζωκότας, περικάρδιο)



Μονόστιβα επιθήλια

β. Μονόστιβο κυβοειδές

Νεφρικά σωληνάρια





Κύτταρο: Ύψος = Πλάτος = Βάθος

Μονόστιβα επιθήλια

γ. Μονόστιβο κυλινδρικό

Εντερικό επιθήλιο




Κύτταρο: Ύψος > Πλάτος

Πολύστιβα επιθήλια

β. Πολύστιβο πλακώδες με υψηλού βαθμού
κερατινοποίηση



Επιδερμίδα



Πολύστιβα επιθήλια

α. Πολύστιβο πλακώδες με μέτριο βαθμό κερατινοποίησης (μη κερατινοποιημένο)


Οισοφάγος, κόλπος



Ειδικές κατηγορίες

α. Ψευδοπολύστιβο

Κυλινδρικό με κροσσούς-Τραχεία




Όλα τα κύτταρα βρίσκονται σε επαφή με τη βασική μεμβράνη.

Μερικά κύτταρα δεν φτάνουν μέχρι την επιφάνεια του επιθηλίου

Ειδικές κατηγορίες

α. Ψευδοπολύστιβο



Κυλινδρικό με στερεοκροσσούς- Επιδιδυμίδα



Ειδικές κατηγορίες

β. Μεταβατικό

Ουροδόχος κύστη




Εμφανίζεται σαν ψευδοπολύστιβο ή σαν πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο.

Τα επιπολής κύτταρα μεταβάλλουν το σχήμα και τη θολωτή διαμόρφωση της επιφάνειάς τους.

Ταξινόμηση διαφορετικών τύπων επιθηλίων


- **Σχήμα μεμονωμένων κυττάρων**
 - πλακώδη,
 - **Ενδοθήλιο** : μονόστιβο επιθήλιο που επενδύει αγγεία και λεμφαγγεία,
 - **Μεσοθήλιο** : μονόστιβο επιθήλιο που επενδύει κοιλότητες, όπως περιτόναιο, υπεζωκότας και περικάρδιο,
 - κυβοειδή,
 - κυλινδρικά
- **Διάταξή τους σε μία ή περισσότερες στιβάδες**
 - μονόστιβα (ενδοθήλιο, μεσοθήλιο),
 - πολύστιβα
 - Ειδικές κατηγορίες :
 - **Ψευδοπολύστιβο** : βασικά και κυλινδρικά κύτταρα, όπου μόνο τα δεύτερα φτάνουν στην προσαύλια επιφάνεια (τραχεία, επιδιδυμίδα)
 - **Μεταβατικό (ουροθήλιο)** : βασικά και κυλινδρικά κύτταρα, με μεταβαλλόμενο ύψος ανάλογα με την κατάσταση του οργάνου

Τύποι επιθηλίων



Πολικότητα επιθηλιακών κυττάρων

- **Κορυφαία περιοχή :** προς τον αυλό ή το εξωτερικό περιβάλλον,
- **Πλάγια περιοχή :** συνδέεται με παρακείμενα κύτταρα με μόρια κυτταρικής προσκόλλησης και συνδετικά συμπλέγματα,
- **Βασική περιοχή :** συνδέεται με τον βασικό υμένα




Πολικότητα επιθηλιακών κυττάρων

Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά περιοχών

Κορυφαία περιοχή :


- δομές για **προστασία επιθηλίου**, π.χ. κροσσοί,
- για **απορρόφηση ουσιών**, π.χ. μικρολάχνες στο εντερικό επιθήλιο

Πλαγιοβασική περιοχή : δομές για πρόσδεση των κυττάρων μεταξύ τους και με τη βασική μεμβράνη(=βασικός υμένας +στοιχεία συνδ. ιστού), τα **συνδεδετικά συμπλέγματα** και τα **μόρια κυτταρικής προσκόλλησης**




Κορυφαία περιοχή επιθηλιακών κυττάρων


Ειδικές δομές



1. Κροσσοί



2. Μικρολάχνες





3. Στερεοκροσσοί

Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής

1. Κροσσοί

- **κινητές** κυτταρικές προεκβολές που προέρχονται από τα **βασικά σωμάτια**
- **βασικό σωμάτιο** : 9 τριάδες μικροσωληνίσκων σε ελικοειδή διάταξη
- **κροσσός** : κεντρικό **αξόνημα** με 9 περιφερικές δυάδες και ένα κεντρικό ζεύγος μικροσωληνίσκων (δομή «9+2»)




Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής

1. Κροσσοί

Λειτουργία

- Τραχεία
 - Τοπική άμυνα
- Ωαγωγοί
 - Μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα



Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής


1. Μονήρης Κροσσός

- Ειδικός τύπος κροσσού, που υπάρχει σε ορισμένα είδη κυττάρων,
- Δεν είναι κινητός,
- Συμμετέχει στην πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη,
- Σχετίζεται με διαταραχές υπολειπόμενης κληρονομικότητας, τις **παθήσεις των κροσσών**, λόγω δομικών και λειτουργικών παθήσεων των κροσσών **,
- βρίσκεται στα τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti (έσω ους), *κινησεοκροσσός*

** Παθήσεις των κροσσών σε νοσήματα όπως η παχυσαρκία, οι πολυκυστικοί νεφροί, η διανοητική υστέρηση, η τύφλωση και δυσμορφίες στην ανάπτυξη

Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής

1^α. Μαστίγια




Το αξόνημα, αλλά μεγαλύτερο σε μήκος, απαντάται στον άνθρωπο στην ουρά των σπερματοζωαρίων, και καλείται **μαστίγιο**.

Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής


2. Μικρολάχνες

- Δακτυλοειδείς κυτταρικές προεκβολές που περιέχουν κεντρική περιοχή διασυνδεόμενων **μικροϊνιδίων ακτίνης**,
- Στο κυτταροπλασματικό άκρο, οι δεσμίδες ακτίνης εισέρχονται στο **τελικό υμένιο**, ένα δίκτυο κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών παράλληλο με την κορυφαία περιοχή του κυττάρου



Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής

2. Μικρολάχνες



Λειτουργία

- αύξηση επιφάνειας,
- απορροφητική λειτουργία (ψηκτροειδής παρυφή εντέρου).

Βρίσκονται στο λεπτό έντερο και σε τμήματα του νεφρώνα


Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής

3. Στερεοκροσσοί

Μακρές, διακλαδιζόμενες δακτυλοειδείς κυτταρικές προεκβολές που περιέχουν κεντρική περιοχή διασυνδεδεμένων **μικροινιδίων ακτίνης**, τα οποία συνδέονται με άλλες πρωτεΐνες.


Η κορυφαία περιοχή περιέχει κυστίδια.

Δεν έχουν αξονήματα.



Ειδικές δομές κορυφαίας περιοχής

3. Στερεοκροσσοί



Βρίσκονται στην επιδιδυμίδα, συμβάλλοντας στην ωρίμανση του σπέρματος.

Κυτταρικές συνδέσεις

Η ακεραιότητα του επιθηλίου οφείλεται στη σύνδεση των επιθηλιακών κυττάρων μεταξύ τους και με τον βασικό υμένα.

Κυτταρικές συνδέσεις


- συμβάλλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας
- σε αυτές συμμετέχουν τα **μόρια κυτταρικής προσκόλλησης**
- δεν αφορούν μόνο το επιθήλιο, αλλά και άλλους ιστούς, όπως ο καρδιακός μυς.

Μόρια κυτταρικής προσκόλλησης

- **εξαρτώμενα από ιόντα Ca^{2+} :**
 - καδερίνες,
 - σελεκτίνες
- **μη εξαρτώμενα από ιόντα Ca^{2+} :**
 - υπεροικογένεια ανοσοσφαιρινών,
 - ιντεγκρίνες


Καδερίνες

- Κύριες πρωτεΐνες προσκόλλησης των επιθηλιακών κυττάρων,
- Συμμετέχουν στη μορφογένεση,
- Υπάρχουν περισσότερα από 40 είδη, όπως E-, N-, P-καδερίνη
- Σχηματίζουν cis- ομοφιλικά διμερή
- Εμφανίζουν trans-ομοφιλική ή ετεροφιλική αλληλεπίδραση (σύνδεση διμερών ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας) στην κυτταρική μεμβράνη των γειτονικών κυττάρων




Καδερίνες

- Το κυτταροπλασματικό τμήμα τους συνδέεται με την **ακτίνη** μέσω του **συμπλόκου της κατενίνης** :
 - κατενίνη α, β, γ και
 - πρωτεΐνες συνδεόμενες με την ακτίνη
- σύνδεση ακτίνης με σύμπλοκο καδερίνης-κατενίνης σημαντική για
 - Κυτταρική μορφογένεση,
 - Μεταβολές κυτταρικού σχήματος,
 - Κυτταρική πολικότητα




Σελεκτίνες

- πρωτεΐνες προσκόλλησης των επιθηλιακών κυττάρων εξαρτώμενες από ιόντα Ca^{2+} ,
- Προσδένονται σε υδατάνθρακες (ομάδα των λεκτινών), για τους οποίους φέρουν περιοχή αναγνώρισης (CRD), η μοριακή διαμόρφωση της οποίας ρυθμίζεται από το ασβέστιο,
- Συμμετέχουν στην εξαγγείωση των λευκοκυττάρων κατά τον εποικισμό,
- Κύριες κατηγορίες : P-(αιμοπετάλια, ενδοθήλια), E-(ενδοθήλια) και L-(λεμφοκύτταρα) σελεκτίνες




Σελεκτίνες




Σελεκτίνες, ιντεγκρίνες και διακυτταρικά μόρια κυτταρικής προσκόλλησης (ICAMs) παίζουν ρόλο στη **φλεγμονή** και στον **εποικισμό των λεμφικών οργάνων** από τα λεμφοκύτταρα

Μόρια κυτταρικής προσκόλλησης Υπεροικογένεια ανοσοσφαιρινών (Ig, CAMs)

- μόρια κυτταρικής προσκόλλησης των επιθηλιακών κυττάρων που **δεν εξαρτώνται από ιόντα Ca^{2+}** ,
- τα μέλη προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα του mRNA και εμφανίζουν διαφορές γλυκοζυλίωσης,
- εξωκυττάρια, εμφανίζουν μία ή περισσότερες περιοχές τύπου ανοσοσφαιρίνης,




Υπεροικογένεια ανοσοσφαιρινών (Ig)



- συνδέονται με πανομοιότυπα μόρια στην επιφάνεια άλλου κυττάρου (trans-ομοφιλική) ή άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας (trans-ετεροφιλική σύνδεση),
- συμμετέχουν στον **εποικισμό κατά τη φλεγμονή**


Ιντεγκρίνες

- πρόκειται για **ετεροδιμερή**, αποτελούμενα από **δύο υπομονάδες**, την **α** και **β**,
- από συνδυασμούς διαφορετικών υπομονάδων **α** και **β** προκύπτουν **22 διαφορετικά ετεροδιμερή ιντεγκρινών**,
- διπλή λειτουργία : προσδένονται στον ενδοκυττάριο κυτταροσκελετό και στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία,



Ιντεγκρίνες


- η εξωκυττάρια περιοχή της **β υπομονάδας** προσδένεται στην **λαμινίνη** και **ινονεκτίνη** της **βασικής μεμβράνης** (εξωκυττάρια θεμέλια ουσία) μέσω της αλληλουχίας RGD, σημαντική λειτουργία κατά την **εμβρυογένεση**,
- μέσω της **β υπομονάδας** προσδένονται και στον κυτταροσκελετό ,



- ❖ μεσολαβούν και σε διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις, όπως κατά τον **εποικισμό**,
- ❖ μεταβάλλουν τη χωροδιάταξή τους, απαντώντας σε διακυτταρικές διεργασίες, μέρος της σηματοδότησης «από μέσα προς τα έξω»
- ❖ λειτουργούν ως μεταγωγείς σήματος

Συνεργασία μορίων σύνδεσης κατά τον εποικισμό των λευκοκυττάρων

1 Τα κυκλοφορούντα λευκοκύτταρα (ουδετερόφιλα), ανθίστανται στις δυνάμεις διάτμησης, επιβραδύνοντας τη ροή τους κατά μήκος του αγγειακού ενδοθηλίου.



2 Η χαλαρή προσκόλληση στο ενδοθήλιο σε συνθήκες βραδείας ροής έχει ως αποτέλεσμα τα λευκοκύτταρα να «κυλούν» (rolling) πάνω στο ενδοθήλιο. Οι σελεκτίνες, που βρίσκονται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, προσδένονται στους υδατανθρακικούς συνδέτες στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων.

3 Οι ιντεγκρίνες που δρουν ως υποδοχείς για τους ενδοθηλιακούς ICAM-1 και VCAM-1 συνδέτες ενεργοποιούνται γρήγορα στην επιφάνεια των λευκοκυττάρων κατά τη διάρκεια της ολίσθησής τους στην ενδοθηλιακή επιφάνεια. Χημικοί μεσολαβητές στις περιοχές της φλεγμονής διεγείρουν την ενεργοποίηση των ιντεγκρινών β₁ και β₂. Οι ιντεγκρίνες ενισχύουν την προσκόλληση των λευκοκυττάρων στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων.

4 Η διαενδοθηλιακή μετανάστευση (διαπίδυση) μεσολαβείται από τις ιντεγκρίνες, που αλληλεπιδρούν με συνδέτες της επιφάνειας των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η δυναμική των ινιδίων της F-ακτίνης συμμετέχει σε αυτήν τη διεργασία.

Πρωτείνες ADAM


(a disintegrin and metalloprotease)

- Μεταλλοπρωτεϊνάσες, που διακόπτουν τη σύνδεση των ιντεγκρινών με τη μεσοκυττάρια ουσία,
- Σημαντικές στη γονιμοποίηση, αγγειογένεση, νευρογένεση, καρκίνο, νόσο του Alzheimer,
- Έχουν *εξωκυττάρια περιοχή* (που περιέχει **μεταλλοπρωτεϊνάση** και **δισιντεγκρίνη**) και *ενδοκυττάρια περιοχή*,
- Διασπώντας το εξωκυττάριο τμήμα μεμβρανικών πρωτεϊνών, με απελευθέρωση του TNF- α και των συνδετών του EGF, αυτοί μπορούν να δράσουν σε απόσταση (παρακρινής δράση),
- Ρυθμίζουν τη σηματοδοτική δράση μεμβρανικών υποδοχέων και των συνδετών τους

Πρωτείνες ADAM

(a disintegrin and metalloprotease)

- Στην εξωκυττάρια περιοχή περιλαμβάνεται **περιοχή δισιντεγκρίνης**: προσδένεται στις ιντεγκρίνες, ανταγωνιστικά με τις πρωτείνες της μεσοκυττάριας ουσίας, μέσω αλληλουχίας RGD, κι έτσι εμποδίζεται η πρόσδεση των κυττάρων,
- και **περιοχή μεταλλοπρωτεϊνάσης**: αποδομεί τη θεμέλια ουσία και βοηθά τη μετανάστευση των κυττάρων



Κυτταρικές συνδέσεις

Κυτταρικές συνδέσεις

- δομές μεταξύ παρακείμενων κυττάρων, που προσφέρουν **σταθερότητα**
- συμμετέχουν στην **παρακυτταρική οδό** μετακίνησης διαλυτών, ιόντων και νερού,
- διασφαλίζουν τη λειτουργία του φραγμού

Κυτταρικές συνδέσεις

– συμμετρικές :

❖ στενές,

❖ πρόσδεσης

✧ πρόσφυσης ,

✧ δεσμοσώματα,


❖ χασματικές

– ασύμετρες :

❖ ημιδεσμοσώματα

Είδη συμμετρικών κυτταρικών συνδέσεων

- *Στενές, στεγανές,
ή αποφρακτικές συνδέσεις*
- *Συνδέσεις πρόσδεσης
ή αγκυροβολίας*
 - α. συνδέσεις πρόσφυσης
 - β. δεσμοσώματα *
- *Συνδέσεις επικοινωνίας
ή χασματικές*



* Τα ημιδεσμοσώματα είναι ασύμμετρες συνδέσεις


A. Στενές συνδέσεις

Λειτουργίες

- καθορίζουν την πολικότητα των επιθηλιακών κυττάρων,
- εμποδίζουν την ελεύθερη διάχυση λιπιδίων και πρωτεϊνών μεταξύ παρακείμενων κυττάρων,
- συμβάλλουν στη δημιουργία φραγμού, μέσω των επιθηλιακών κυττάρων (παρακυτταρική οδός)


A. Στενές συνδέσεις

- σύντηξη των κορυφαίων περιοχών των μεμβρανών παρακείμενων επιθηλιακών κυττάρων, δημιουργώντας μια συνεχή ταινία,
- συμμετέχουν οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες **οκλουδίνη, κλαουδίνη** (οικογένεια τετρασπανινών), οι **νεκτίνες** και τα **συνδετικά μόρια προσκόλλησης** (Junctional AMs)



Στις στενές συνδέσεις συμμετέχουν οι πρωτεΐνες

- **Οκλουδίνη** : αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες αποφρακτικών συνδέσεων ZO-1, ZO-2, ZO-3 και αφαντίνη
- **Κλαουδίνη** : τα μέλη της οικογένειας σχηματίζουν τα γραμμικά ινίδια των στενών συνδέσεων, συντελώντας στο φραγμό,
- **Νεκτίνες** : συνδέονται μέσω της αφαντίνης με τα ινίδια ακτίνης,
- **Συνδετικά μόρια προσκόλλησης (JAMs)**



B. Συνδέσεις πρόσδεσης

- Βρίσκονται στην κορυφαία περιοχή του κυττάρου, με ζωνοειδή διάταξη, κάτω από τις στενές συνδέσεις,
- συνδέονται με ινίδια ακτίνης
- Στην περιοχή των συνδέσεων πρόσδεσης, ανάμεσα στις κυτταρικές μεμβράνες υπάρχει ελεύθερος μεσοκυττάριος χώρος,



B. Είδη συνδέσεων πρόσδεσης


A. σύνδεση πρόσφυσης:

ζωνοειδής κατανομή,
συνδέεται με ινίδια
ακτίνης μέσω
αλληλεπίδρασης
καδερινών με κατενίνες

B. δεσμόσωμα


κηλιδώδης κατανομή,
συνδέεται με ενδιάμεσα
ινίδια

Γ. ημιδεσμόσωμα



Σύνδεση πρόσφυσης

καδερίνες (δεσμοκολλίνες και δεσμογλείνες), αγκυροβολούν σε κυτταροπλασματικές **δισκοειδείς πλάκες** που περιέχουν δεσμοπλακίνη, πλακοσφαιρίνη και πλακοφιλίνη και συνδεόμενες με **ινίδια ακτίνης** συντελούν στη συνοχή της επιδερμίδας.





Δισκοειδής πλάκα: Δεσμοπλακίνη, πλακοσφαιρίνη & πλακοφιλίνη


Παθολογία στις συνδέσεις πρόσφυσης: πέμφιγα

Φυλλοειδής πέμφιγα:

αυτοάνοση
φυσαλλιδώδης πάθηση
της επιδερμίδας,
αντισώματα κατά της
δεσμογλείνης-1
προκαλούν έλλειψη
συγκόλλησης των
ανώτερων στιβάδων
της επιδερμίδας,
δημιουργία
φυσαλίδας.




Δεσμόσωμα




- κυτταρική σύνδεση που μοιάζει με κηλίδα,
- συνδέεται με ενδιάμεσα ινίδια κερατίνης (τονοϊνίδια), που εκτείνονται από τη μια κηλίδα στην άλλη,
- δίνει δύναμη και ακαμψία στις επιθηλιακές στιβάδες.

Ημιδεσμόσωμα



- ασύμμετρες δομές πρόσδεσης της βασικής περιοχής επιθηλιακών κυττάρων με το βασικό υμένα,
- αποτελούνται από :
 - κυτταροπλασματική δισκοειδή πλάκα (προσδένεται με τα τονοϊνίδια),
 - εξωτερική μεμβρανική πλάκα
- αυξάνουν τη σταθερότητα των επιθηλίων συνδέοντας ινίδια του κυτταροσκελετού με το βασικό υμένα.

Γ. Χασματικές Συνδέσεις




- συμμετρικές συνδέσεις επικοινωνίας,
- σχηματίζονται από μεμβρανικές πρωτεΐνες, τις **κοννεξίνες**,
- έξι μονομερή σχηματίζουν το **κοννεξόνιο**, κοίλη δομή, η ευθυγράμμιση των οποίων δημιουργεί διάυλο επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων,
- διακινούν μόρια μεταξύ των κυττάρων, ενώ κλείνουν σε αυξ. συγκέντρωση Ca^{2+} .

Βασική μεμβράνη

- **Βασικός υμένας** : εξωκυττάρια ουσία σε επαφή με τη βασική επιφάνεια του επιθηλίου,
 - λαμινίνη, εντακτίνη, κολλαγόνο τύπου IV, πρωτεογλυκάνες
- **Ινοδικτυωτός υμένας**
 - κολλαγόνο τυπου III

Στο φωτονικό μικροσκόπιο, με χρώση PAS, οι 2 μαζί φαίνονται ως μια δομή, την **βασική μεμβράνη**



Επιθηλιακοί αδένες



Επιθηλιακοί αδένες

Συμπαγείς καταδύσεις επιθηλιακών κυττάρων στον υποκείμενο συνδετικό ιστό

- **Εξωκρινείς** : το προϊόν μεταφέρεται στην επιφάνεια μέσω απεκκριτικού πόρου,
- **Ενδοκρινείς** : περιβάλλονται από θυριδωτά τριχοειδή προς τα οποία , μετά από χημική διέγερση ή μέσω ηλεκτρικών σημάτων, απελευθερώνουν την έκκρισή τους στην κυκλοφορία,
- **Μεμονωμένα αδενικά κύτταρα** (εντεροενδοκρινικά)



Τμήματα εξωκρινούς αδένου :

-απεκκριτικός πόρος

-εκκριτική μοίρα

Ταξινόμηση εξωκρινούς αδένου
ανάλογα με ...

- τον τύπο του απεκκριτικού πόρου
 - την εκκριτική μοίρα
 - τα κύτταρά της
 - το σχήμα της

Ταξινόμηση εξωκρινούς αδένες

- **απεκκριτικός πόρος :**

- απλοί,
- διακλαδισμένοι (ή σύνθετοι),


- **εκκριτική μοίρα :**

ανάλογα με τα είδη κυττάρων


- μονοκυτταρική: ένας τύπος,
- πολυκυτταρική: πολλοί τύποι,

ανάλογα με το σχήμα της

- σωληνοειδείς αδένες, π.χ. παχύ έντερο
- εσπειραμένοι, π.χ. ιδρωτοποιοί αδένες
- κυψελοειδείς ή βοτρυοειδείς, π.χ. σμηγματογόνοι αδένες
- σωληνοκυψελοειδείς.




Είδη απλών επιθηλιακών αδένων



Είδη διακλαδισμένων επιθηλιακών αδένων

Αδένες της στοματικής κοιλότητας


Απεκκριτικός
πόρος



Διακλαδισμένος σωληνοειδής αδένας

Εξωκρινές πάγκρεας

Απεκκριτικός
πόρος



Διακλαδισμένος κυψελοειδής/
βοτρυοειδής αδένας


Μαζικός αδένας

Απεκκριτικός
πόρος




Διακλαδισμένος σωληνοκυψελοειδής αδένας

Οργάνωση σύνθετου αδένα



Μηχανισμοί έκκρισης

Εξωκρινής έκκριση




Μεροκρινής

Εξωκυττάρωση κυτταρικού προϊόντος από την κορυφαία επιφάνεια του κυττάρου σε ελεύθερη επιφάνεια (αυλός) π.χ. κοκκία ζυμογόνου παγκρέατος



Αποκρινής


Απόσπαση **μέρους κυτταροπλάσμα-τος** από την κορυφαία επιφάνεια του κυττάρου σε ελεύθερη επιφάνεια (αυλός), π.χ. λιπίδια στο μαστό



Ολοκρινής

Αποβολή **ολόκληρου του κυττάρου** που περιέχει το έκκριμα σε ελεύθερη επιφάνεια (αυλός), π.χ. σμήγμα

Ενδοκρινής έκκριση




Εξωκυττάρωση εκκρητικού προϊόντος **από την πλάγια ή βασική** επιφάνεια του κυττάρου **απευθείας** στην **αιματική κυκλοφορία**

Τύποι έκκρισης


- **Βλεννώδεις αδένες** : προϊόντα πλούσια σε γλυκοπρωτεΐνες και νερό, εκκριτικά κυστίδια βλέννης, π.χ. υπογλώσσιος αδένας
- **Ορώδεις αδένες** : εκκρίσεις πλούσιες σε πρωτεΐνες και νερό, παρουσία κοκκίων ζυμογόνου, π.χ. παρωτίδα
- **Μεικτοί αδένες**: αποτελούνται από βλεννώδη και ορώδη κύτταρα, π.χ. υπογνάθιος αδένας

Ορώδης έκκριση



Βλεννώδης έκκριση

Συνέχεια στο εργαστήριο



Καλό διάβασμα