


Χόνδρος Αρθρώσεις

Σοφία Χαβάκη
Επικ. Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ




Χόνδρος

- συνδετικός-στηρικτικός ιστός
- συμπαγής αλλά εύκαμπτος
- είναι ανάγγειος



Λειτουργίες Χόνδρου



- υποστήριξη μαλακών ιστών
- απορρόφηση κραδασμών
- εξασφάλιση ολισθηρής επιφάνειας για τις αρθρώσεις
- συμμετοχή στην ανάπτυξη και αύξηση των μακρών οστών

Κύτταρα χόνδρου


α. Χονδροβλάστες

υποστρόγγυλα
κενοτοπιώδη κύτταρα
που περιέχουν:

- γλυκογόνο,
- λιπίδια
- άφθονο αδρό
ενδοπλασματικό δίκτυο
- συσκευή Golgi

Pόλος;

σύνθεση εξωκυττάριας ονσίας




N: πυρήνας, G: συσκευή Golgi,
M: μιτοχόνδριο, rER: αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο

β. Χονδροκύτταρα

- είναι πρώην χονδροβλάστες που έχουν παγιδευτεί σε χώρο της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας: **το βοθρίο**
- περιέχουν: γλυκογόνο, λιπίδια, αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, συσκευή Golgi
- Διαιρούνται (με μίτωση) και τα θυγατρικά κύτταρα μένουν στο βοθρίο → **ισογενή ομάδα** (διπλό βέλος)

Pόλος;

σύνθεση και συντήρηση της εξωκυττάριας ουσίας




Source: Histology, a text and atlas, Ross and Pawlina, 6th ed.



Source: Histology, a text and atlas, Ross and Pawlina, 6th ed.

Χονδροβλάστες → Χονδροκύτταρα




TM: περιοχική θεμέλια ουσία (territorial matrix)

IM: διαμεσοπεριοχική θεμέλια ουσία (interterritorial matrix)

- **ισογενής ομάδα** χονδροκυττάρων. Βρίσκονται μέσα σε βοθρίο
- **περιοχική** θεμέλια ουσία – **περικυττάρια** θεμέλια ουσία
- **διαμεσοπεριοχική** θεμέλια ουσία

Βοθρία σε ΕΘΟ ινώδους χόνδρου




Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης


L: βοθρίο, **βέλη**: ίνες κολλαγόνου I

Εξωκυττάρια ουσία

- γλυκοζαμινογλυκάνες
 - ναλουρονικό οξύ
 - θεική χονδροϊτίνη
 - θεική κερατάνη
- δέσμευση μορίων νερού
- ενυδατωμένη θεμέλια ουσία
- αντίσταση στις δυνάμεις συμπίεσης
- ιιιδικές πρωτεΐνες
 - κολλαγόνο τύπου I και II, ελαστίνη
- μηχανική σταθερότητα, ελαστικότητα
- σύνδεση με γύρω συνδετικούς ιστούς
- γλυκοπρωτεΐνες
- χονδροεκτίνη, τενασκίνη, ινονεκτίνη




Εξωκυττάρια ουσία




Περιχόνδριο

- συνδετικός ιστός που περιβάλλει τον χόνδρο
- περιέχει ινοβλάστες που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε χονδροβλάστες για το σχηματισμού νέου χόνδρου.

Περιχόνδριο [



Περιχόνδριο




1. Ινώδης στιβάδα: ιωβλάστες, κολλαγόνο τύπου I, ελαστίνη
2. Χονδρογενής στιβάδα: ατρακτοειδείς χονδροβλάστες

ο χόνδρος τρέφεται με διάχυση θρεπτικών ουσιών από το περιχόνδριο ή από το αρθρικό νγρό στις αρθρικές κοιλότητες.

Αύξηση του χόνδρου

- αποθετική αύξηση
διαφοροποίηση ινοβλαστών, που βρίσκονται
στο περιχόνδριο, σε χονδροβλάστες —>
μιτωτικές διαιρέσεις —> νέες
χονδροβλάστες: πυρήνες χονδρογένεσης
- διάμεση αύξηση
μιτωτικές διαιρέσεις προϋπαρχόντων
χονδροβλαστών —> θυγατρικά κύτταρα
μέσα σε βιθρίο —> **χονδροκύτταρα σε
ισογενείς ομάδες**

Περιχόνδριο [




Είδη χόνδρου

- Υαλοειδής χόνδρος
- Ελαστικός χόνδρος
- Ινώδης χόνδρος

Οι διαφορές τους οφείλονται στο είδος και στην αναλογία των **συστατικών** της εξωκυττάριας ουσίας.


Υαλοειδής χόνδρος



- κολλαγόνο τύπου II, σαν διαπλεκόμενα λεπτά ινίδια
- πρωτεογλυκάνες και χονδρονεκτίνη

Υαλοειδής χόνδρος

- περιχόνδριο με ινοβλάστες που διαφοροποιούνται σε χονδροβλάστες
- χονδροκύτταρα διατασσόμενα σε ισογενείς ομάδες στη διαμεσοπεριοχική θεμέλια ουσία
- **περιοχική θεμέλια ουσία** γύρω από τις ισογενείς ομάδες



Π: περιοχική θεμέλια ουσία


Δ: διαμεσοπεριοχική θεμέλια ουσία

Υαλοειδής χόνδρος

- προσωρινός σκελετός κατά την εμβρυική ανάπτυξη
- επιφυσιακός δίσκος μακρών οστών
- αρθρικές επιφάνειες αρθρώσεων
(δεν έχει περιχόνδριο)
- στηρικτικός ιστός αναπνευστικής οδού


Ελαστικός χόνδρος

- κολλαγόνο τύπου II
- παρουσία ελαστικών ινών (ελαστικότητα και ευκαμψία)
- η δομική οργάνωση είναι ίδια με αυτή του ναλοειδούς χόνδρου (περιχόνδριο, ισογενείς ομάδες, περιοχική θεμέλια ουσία, διαμεσοπεριοχική θεμέλια ουσία)




Ελαστικός χόνδρος

- πτερύγιο του αυτιού
- τοίχωμα έξω ακουστικού πόρου
- ευσταχιανή σάλπιγγα
- επιγλωττίδα λάρυγγα




Ινώδης χόνδρος



K: ίνες κολλαγόνου τύπου I, βέλος: χονδροκύτταρο

- **χονδροκύτταρα και ινοβλάστες**
- **εξωκυττάρια θεμέλια ουσία με αδρές κολλαγόνες ίνες τύπου I**
- **δεν έχει περιχόνδριο**
- **μεγάλη μηχανική αντοχή**

Ινώδης χόνδρος



- μεσοσπονδύλιοι δίσκοι
- προσφύσεις τενόντων στα οστά
- συγχονδρώσεις πλατέων οστών πυέλου

Αρθρώσεις

Τα οστά συνδέονται με αρθρώσεις.

Συναρθρώσεις

- αρθρώσεις με μικρή ή καθόλου κινητικότητα
- προστατευτικός και υποστηρικτικός ρόλος

Αμφιαρθρώσεις

- αρθρώσεις με ελάχιστη κινητικότητα
(μεσοσπονδύλιοι δίσκοι με σώματα σπονδύλων)


Διαρθρώσεις

- αρθρώσεις με ελεύθερη κινητικότητα,
- διαμόρφωση αρθρικής κοιλότητας που περιέχει αρθρικό υγρό (λιπαντικό μέσο)
- υαλοειδής χόνδρος στις αρθρικές επιφάνειες
- συγκράτηση της άρθρωσης με συνδέσμους (ταινίες πυκνού ινοκολλαγονώδους ιστού) → σταθερότητα κίνησης

Συναρθρώσεις


- **Ινώδεις αρθρώσεις** (ινοκολλαγονώδης συνδετικός ιστός)
ραφές: οστά κρανίου
γομφώσεις: μεταξύ δοντιών και παρακείμενου οστού
συνδεσμώσεις: παρακείμενα οστά συνάπτονται με έναν **σύνδεσμο** (μεσόστεος υμένας μεταξύ κερκίδας και ωλένης)
- **Χονδρώδεις αρθρώσεις** (υαλοειδής ή ινώδης χόνδρος)
συγχονδρώσεις: σύνδεση πλευρών με στέρνο, συζευκτικοί χόνδροι αναπτυσσόμενων οστών, **σύνδεση με ινώδη χόνδρο** ⇒ πλατιά οστά πυέλου.
συμφύσεις: ηβική σύμφυση (ινώδης χόνδρος)
- **Συνοστώσεις**
σύνδεση με οστίτη ιστό στα οστά του κρανίου σε υπερήλικες

Αρθρώσεις σπονδυλικής στήλης



- **Αμφιαρθρώσεις**
μεταξύ μεσοσπονδύλιων δίσκων και σπονδυλικών σωμάτων
 - **Διαρθρώσεις**
μεταξύ σπονδυλικών αποφύσεων
(γληνοειδείς ή αρθρικές αποφύσεις)
- κινητικότητα σπονδυλικής στήλης (κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη, στροφή)

Μεσοσπονδύλιος δίσκος





- Απορροφά τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων.
- Επιτρέπει τη σχετική κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης.

Μεσοσπονδύλιος δίσκος

Δομή:


- ναλοειδής χόνδρος
- ινώδης δακτύλιος :
 - α) εξωτερικός δακτύλιος κολλαγόνου και
 - β) ινώδης χόνδρος με πεταλιώδη συγκεντρική διάταξη
- πηκτοειδής πυρήνας :
 - κεντρική περιοχή με ζελατινώδη ουσία
 - φυσσαλιδοφόρα κύτταρα
 - θεμέλια ουσία



ΙΔ: ινώδης δακτύλιος

ΠΠ: πηκτοειδής πυρήνας



Κήλη Μεσοσπονδύλιον Δίσκου




Διαρθρώσεις

Διαμόρφωση αρθρικής κοιλότητας :

- **σύνδεσμοι**
- **αρθρικός θύλακας :**
 - A. ινώδης στιβάδα (αρθρική ινώδης κάψα) + αιμοφόρα αγγεία**
 - B. αρθρικός υμένας:**
 - **χαλαρός ινοκολλαγονώδης ιστός λιποκύτταρα, σιτευτικά κύτταρα, μακροφάγα, θυριδωτά τριχοειδή**
 - **αρθρικά (συνοβιακά) κύτταρα κύτταρα-A (μακροφάγα) κύτταρα-B (ινοβλάστες)**
- **αρθρικό υγρό**
 - **ναλουρονικό οξύ, γλυκοπρωτεΐνες, λευκοκύτταρα**



Αρθρικές επιφάνειες διάρθρωσης



Αρθρικός χόνδρος : ΥΑΛΟΕΙΔΗΣ

- **δεν έχει περιχόνδριο**
- **τοξοειδής διάταξη ινών κολλαγόνου για καλύτερη κατανομή και απορρόφηση των μηχανικών πιέσεων στις αρθρικές επιφάνειες**

Οστεοαρθρίτιδα



- **εκφύλιση αρθρικού χόνδρου**
- **διάβρωση επιφάνειας των γειτονικών οστών**
- **οστεόφυτα στα άκρα των οστικών επιφανειών**
- **πάχυνση αρθρικού θυλάκου**
- **σμίκρυνση αρθρικού χώρου**